




La varicelle



Maladie extrêmement contagieuse

Quelques chiffres



700 000

cas de varicelle / an



90%

des cas chez des enfants de moins de 10 ans



20
décès / an

70%

des cas chez des enfants de moins de 10 ans



90%

de la population immunisée contre la varicelle après 10 ans



10 à 2000

vésicules (en plusieurs poussées)

La transmission



Par voie respiratoire (gouttelettes de salive)



Par contact direct avec les vésicules cutanées

Contagion

24 à 48h

avant l'apparition des rougeurs

1 semaine

avant l'apparition des vésicules qui deviennent des croûtes sèches

Après contamination

la période d'incubation dure **10 à 21 jours** (l'enfant n'a pas de symptômes)

Les symptômes



Fièvre



Eruption cutanée de vésicules remplies de liquide



Forte démangeaisons

Evolution & complication




10% à 15%
réactivation de l'infection virale sous forme de zona

Quand on a eu la varicelle = on est immunisé



Surinfection des lésions



Syndrome de Reye chez l'enfant



Forme grave et étendue de varicelle



Risque complication augmente avec l'âge

Traitement



Gardez l'enfant à la maison



Prendre soin des boutons (savon doux, couper les ongles, antiseptique liquide local) & antihistaminique en cas de grattage



Ne pas donner d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène) mais uniquement du paracétamol



Pour la varicelle, il n'y a pas d'éviction scolaire à proprement parler. Toutefois, on considère **que l'enfant touché peut revenir à l'école quand les vésicules deviennent sèches** : beaucoup moins de démangeaisons et de risques de surinfection des lésions.

Le directeur, Xavier Moison